

いぼ痔でお悩みの方に

いぼ痔を切らずに治す

ジオン注射療法(ALTA療法)

「ジオン注射療法(ALTA療法)」は、脱出を伴う内痔核に「ジオン注」という薬剤を投与して、痔に流れ込む血液の量を減らし、痔を硬くして粘膜に固着・固定させる最新の治療法です。

痛みがほとんどない!


痔核を切り取る手術とは違って、痔核の痛みを感じない部分に注射をするため、痛みを感じることはほとんどなく、術後も「傷口が痛む」といったことはありません(注射療法に手術を併用することもあります)。

短期間の入院でOK!

また、入院期間も、1週間程度必要な切除手術と比べて2~3日の入院で済み、早期に社会復帰できるとともに、医療費などの負担も軽減されます。

治療方法について

- ジオン注を投与する前に肛門周囲への麻酔か、下半身だけに効く麻酔を行い、肛門周囲の筋肉を緩め注射しやすくします。痛みを感じない箇所に注射するため、痛みはありません。
- ジオン注はひとつの痔核に対して4箇所に分割して投与します。これは痔核に薬液を十分に浸透させるための方法で、「四段階注射法」といいます。
- 複数の痔核がある場合には、それぞれに投与します。
- 投与後しばらく点滴を続け、麻酔の影響がなくなるまで安静にする必要があります。



治療後の経過について

- 投与後の早い時期に痔核へ流れ込む血液の量が減り、出血が止まります。脱出の程度も軽くなります。
- 排便は翌日から可能です。痛みをこわがって我慢しないようにしましょう。
- 投与した部分が次第に小さくなり、1週間~1カ月で、引き伸ばされていた支持組織が元の位置に固着・固定して脱出がみられなくなります。また、出血がみられなくなり、肛門のまわりの腫れがなくなります。



北海道医療生活協同組合

札幌緑愛病院

TEL 011-883-0121

FAX 011-883-7261

〒004-0861 札幌市清田区北野1条1丁目6-30

● メールアドレス info@ryokuai.com

● ホームページ www.ryokuai.com

■ 診療時間: 平日9:00~17:00 / 土曜9:00~12:00

■ 夜間診療 (内科): 月曜日 17:00~19:00

■ 休診日: 日曜・祝日

緑愛